

Actinidia – Kiwi Verde

Impianti in produzione - Agricoltura Convenzionale



PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA

Fase di applicazione	Modo d'uso	Intervento base	Suggerimenti ulteriori <i>Interventi mirati per ogni specifica situazione culturale</i>
Ingressamento gemme	1 Fogliare		Per il benessere delle piante: • MINUS Rame 6 kg/ha
Rottura gemme	1 Concimazione di base	Concime organico o organo-minerale	Orgazot Plus (Micro)* 200-250 kg/ha * ORGAZOT Plus (Micro) è il concime organico granulare consigliato da GERMINA per la concimazione solida di base. ORGAZOT Plus (Micro) è prodotto da AGM SRL
	1 Fogliare		Per favorire il germogliamento delle gemme: • BETTER 1 kg/ha
Germogli lunghi circa 10 cm	1 Fertirrigazione	RED Radicale 15 kg/ha + MAIOR 0-42-50 15 kg/ha	Per favorire ulteriormente lo sviluppo vegetativo: + BLU 20 kg/ha
	1 Fogliare	MINUS Rame 4 kg/ha + MINUS Zinco 2 kg/ha	
	Fogliare da ripetere se necessario		In caso di rischio gelate: • ICE TIME 5-6 kg/ha (una o più applicazioni in base alla necessità)
Germogli lunghi circa 20-30 cm	1 Fogliare	MAIOR PLUS 3 kg/ha + RELIFE 1 kg/ha	Per trattare una carenza di ferro: + MINUS Ferro 3 kg/ha
	1 Fogliare	MINUS Rame 4 kg/ha + MINUS Zinco 2 kg/ha	
	Fogliare da ripetere se necessario		In caso di rischio gelate: • ICE TIME 5-6 kg/ha (una o più applicazioni in base alla necessità)
Prefioritura (bottoni)	1 Fogliare	MAIOR PLUS 3 kg/ha + RELIFE 1 kg/ha	Per indurre una resistenza ad alte temperature: + RED 1 kg/ha;
	1 Fogliare		Per il recupero da stress abiotici: • MINUS Rame 2-3 kg/ha
	1 o più Fogliari Da applicare prima di una gelata		In caso di rischio gelate: • ICE TIME 6 kg/ha (una o più applicazioni in base alla necessità)
	1 Fertirrigazione	RED Radicale 15 kg/ha + MAIOR 0-42-50 15 kg/ha + BLU 20 kg/ha	
Da fine fioritura a formazione frutticini	1 Fogliare	MAIOR NOVA 3 kg/ha + RELIFE 1 kg/ha	Per favorire l'allegagione fiori e formazione frutto: + BETTER 1 kg/ha (ripetere dopo 7 giorni circa)
	Fogliare da ripetere se necessario		In caso di rischio gelate • ICE TIME 6 kg/ha (una o più applicazioni in base alla necessità)
Ingressamento frutti	1 Fogliare	MAIOR PLUS 3 kg/ha	Per indurre una resistenza ad alte temperature: + RED 2-3 kg/ha
- Dopo 10-15 giorni	Fogliari ogni 20 giorni circa	MINUS Calcio 3 kg/ha + RED 3 kg/ha (ogni 20 giorni per tutto il periodo estivo)	Per favorire l'ingrossamento dei frutti: + MAIOR PLUS 3 kg/ha
Post-raccolta	1 Fogliare da ripetere se necessario dopo 10-20 giorni	MINUS Rame 6 kg/ha	
Inverno	Nebulizzazione sul tronco		Per il benessere delle piante: • MINUS Rame 6 kg/ha (ripetere 1-2 volte nel periodo invernale prediligendo le giornate più miti)