

MINUS Ferro

PER CARENZE DI FERRO E RINVERDIMENTO



- PRODOTTO SPECIFICO PER APPLICAZIONE FOGLIARE
- VIENE ASSORBITO RAPIDAMENTE DALLE FOGLIE
- IDEALE PER FERTIRRIGAZIONE IN VASO
- NON È FITOTOSSICO
- RINVERDISCE UNIFORMEMENTE
- NON È FOTOLABILE
- IDONEO PER QUALUNQUE FORMA DI AGRICOLTURA (CONVENZIONALE, BIOLOGICA, BIODINAMICA, ECC.)
- IN FRUTTICOLTURA, VITICOLTURA E ORTICOLTURA PUÒ ESSERE APPLICATO ANCHE DURANTE LA FIORITURA
- NON CONTIENE CHELATI O COMPLESSI CHIMICI DI SINTESI

CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI
SOLUZIONE DI CONCIME A BASE DI
FERRO SOLFATO

Ferro (Fe) solubile in acqua 5%;

Componenti: Ferro solfato.

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

GERMINA

Caratteristiche e proprietà

MINUS Ferro è un concime specifico per l'applicazione fogliare costituito da un complesso di ferro in soluzione e da specifici composti ad azione veicolante che ne agevolano l'assorbimento fogliare e il trasporto all'interno della pianta. La sua funzione è quella di prevenire e curare le carenze da ferro (clorosi ferrice) e pertanto deve essere utilizzato per questo scopo.

Dosi per applicazione fogliare

MINUS Ferro viene applicato a dosi comprese fra 1 e 5 kg/ha o 100-500 g/100 litri. Il prodotto è facilmente assimilabile dalle foglie e, a differenza di altri prodotti a base di ferro fogliare, non presenta particolari problemi di applicazione. Tuttavia il modo migliore di applicare il prodotto è quello di irrorare tutta la superficie fogliare evitando lo sgocciolamento. La quantità di acqua idonea per l'applicazione, in funzione della coltura e del sistema di irrigazione, è pari a 300-1500 litri di acqua/ha.

Pero, Melo e Pomacee in genere - Nel periodo compreso fra ripresa vegetativa e caduta petali applicare 1-3 kg/ha una o più volte (durante la fioritura si consiglia di non superare la dose di 1,5 kg/ha). Da formazione frutticini in poi 2-3 kg/ha. Mantenere 5-10 giorni di distanza da una applicazione all'altra. **Pesco, Susino, Albicocco, Ciliegio e Drupacee in genere** - Nel periodo compreso fra ripresa vegetativa e caduta petali applicare 1-2 kg/ha una o più volte. Da formazione frutticini in poi la dose può essere aumentata a 2-3 kg/ha. Mantenere 7-10 giorni di distanza da una applicazione all'altra. **Actinidia (Kiwi)** - In qualunque periodo del ciclo vegetativo applicare 2-3 kg/ha una o più volte. Mantenere 5-10 giorni di distanza da una applicazione all'altra. **Uliveti** - In qualunque periodo del

ciclo vegetativo applicare 2-3 kg/ha una o più volte. Mantenere 7-10 giorni di distanza da una applicazione all'altra. **Altre colture frutticole** - Applicare 1-3 kg/ha una o più volte in funzione della necessità. Mantenere 7-10 giorni di distanza da una applicazione all'altra. **Vigneti** - Applicare 2-3 kg/ha una o più volte a distanza di 7-10 giorni. **Orticolari, Floricole e le piante in vivaio** - Applicare 200-300 g/100 litri mantenendo 5-7 giorni di distanza da una applicazione all'altra.

Dosi per fertirrigazione

Colture in vaso (erbacee, arbustive e arboree) - 0,5-1 kg/1000 litri a distanza di 7-15 giorni.

UTILIZZARE SOLTANTO IN CASO DI BISOGNO RICONOSCIUTO. NON SUPERARE LE DOSI APPROPRIATE.

Miscibilità

Miscibilità con agrofarmaci: Il prodotto non è miscibile con gli agrofarmaci a base di rame, zolfo, fosfati, fosfati, dodina, fosforganici e olio. Per tutti gli altri formulati la miscibilità deve essere accertata e pertanto si consiglia di effettuare una prova preliminare o di contattare il personale tecnico dell'azienda.

Miscibilità con fertilizzanti: È possibile verificare i concimi compatibili consultando l'apposita sezione del catalogo prodotti e il sito web.

Per informazioni più dettagliate si raccomanda di contattare il servizio tecnico **GERMINA** facendo riferimento al proprio fornitore.

NON SUPERARE LE DOSI INDICATE. IN CASO DI DUBBI SUI DOSAGGI CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE.

PROD. 25.07.2024
L. 010F0001/46-7

FLACONE	TAPPO	ETICHETTA
RACCOLTA PLASTICA		

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

CONSERVARE IL PRODOTTO SIGILLATO ALL'INTERNO DEL CONTENITORE ORIGINALE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO, EVITANDO DI ESPORLO AI RAGGI SOLARI.

MANEGGIARE CON CURA. IN CASO DI FUORIUSCITA DEL PRODOTTO LAVARE CON ACQUA.

MINUS FERRO
UFI: HV00-00H5-W00R-95DX

PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H315 Provoca irritazione cutanea

H318 Provoca gravi lesioni oculari



CONSIGLI DI PRUDENZA

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciaccquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciaccquare.

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVENELENI.

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

Germina di Monduzzi Flavia, Savignano sul Panaro (MO),
Via dell'Artigianato, 1A - Tel. 059 2154196

Peso netto
1 kg